

【別紙2】乳幼児における熱中症予防の確認フローチャート (活動前・活動中・活動後)

ステップ1

リスクのある子どもを把握

(保護者からの情報提供)

- 家庭からの体調管理チェック表を確認
- 連絡ノート、口頭等から体調について確認
- ※特に食事・睡眠がとれているかチェック



異常なし



活動中止

異常あり



pinka.jp - 21850450

ステップ2

活動直前

- 体温(検温)
- 顔色(赤い) 体が熱い
- 機嫌 表情 活気 様子
- 尿が少ない 粘膜の乾燥(歯茎や舌の乾き)



異常なし



活動中止

ひとつでも
あてはまれば



pinka.jp - 21850450

ステップ3

活動中・活動後の体調の変化

- 顔色 機嫌 表情 体温(状況により検温)
- 頭痛 食欲低下 しんどさ・脱力
- 大量の発汗 尿が出ない 嘔気・嘔吐
- うとうとして活気がない

- (その他) 咳や呼吸の状態
 下痢 腹痛



活動中止

※状況により
救急要請

治療が必要
かを判断



pinka.jp - 21850450



★ステップ1. 2ではクラス保育者・教職員で情報共有をしてください。

判断に迷った場合は、必ず活動を中止し、管理職・看護師に報告してください。

★乳児の場合は、急に体調変化する場合があるため、活動中も側で注意深く観察してください。

★WBGTが28度以上の活動中は、必ず10分～15分おきに水分補給をし、休息することを徹底してください。